



VADEMÉCUM
GINECOLOGÍA

 **Fagron**
personalizing
medicine

**TOGETHER
WE CREATE
THE FUTURE OF
PERSONALIZED
MEDICINE**

ÍNDICE

1. MENOPAUSIA
7. ENDOMETRIOSIS
8. DISMINORREA
8. MIOMATOSIS UTERINA, ENDOMETRIOSIS Y ADENOMIOSIS
8. FERTILIDAD
8. VULVODINIA
9. VERRUGAS Y PAPILOMAS GENITALES
11. INFECCIÓN VULVAR POR VIRUS DE VPH
12. FISURAS ANALES
12. HEMORROIDES
13. DOLOR POR EPISIOTOMIA
13. PEZONES AGRIETADOS
15. HIDRATANTES VAGINALES Y VULVARES
16. FOLICULITIS Y PSEUDOFOLICULITIS
18. DERMOCOSMÉTICA
 - ESTRÍAS EN EL EMBARAZO
 - ANTIEDAD
 - PIERNAS CANSADAS

A TU ME DIA

3

MENOPAUSIA TERAPIA NO HORMONAL

Principio activo	Concentración
Citrato de Sildenafil	0,25%
Clorhidrato de L-Arginina	3,6%
Pentruvan	c.s.p. 50 mL

Forma farmacéutica: crema vaginal.

Posología: aplicar 1 mL en los labios vaginales 30 minutos antes de la relación sexual.^{1,2,3}

Indicación: trastorno del deseo sexual hipactivo (DDSH). Estimulante sexual femenino, no hormonal.

Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.

Envase y almacenamiento: frasco unicontrol, a temperatura ambiente inferior a 25°C.

Principio activo	Concentración
Tribulus terrestris	150 mg

Forma farmacéutica: cápsula

Posología: tomar 1 cápsula cada 12 horas.⁴

Indicación: trastorno del deseo sexual hipactivo (DDSH).

Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.

Envase y almacenamiento: frasco pastillero, a temperatura ambiente inferior a 25°C.

Principio activo	Concentración
Siliciumax	300 mg
Vitamina D3	2000 UI
Vitamina K2	180 mcg
Calcio citrato	4800 mg
Syrspend dry	1,25 g

Forma farmacéutica: polvo para reconstituir a suspensión oral.

Posología: diluir el contenido de 1 sobre en 240mL de agua, tomar cada 24 horas.

Indicación: aumento de masa ósea. Suplemento con silicio, asociado a terapia Hormonal.

Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.

Envase y almacenamiento: sachet metalizado, a temperatura ambiente inferior a 25°C.

Principio activo	Concentración
Clorhidrato de Bupropion	75 mg

Forma farmacéutica: cápsula.

Posología: tomar 1 cápsula cada 12 horas, para lograr una dosis de 150 mg/día.^{1,5}

Indicación: trastorno del deseo sexual hipoactivo (DDSH).

Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.

Envase y almacenamiento: frasco pastillero, a temperatura ambiente inferior a 25°C.

Principio activo	Concentración
Pinetónina	30 - 50%
Suero fisiológico	c.s.p. 50mL

Forma farmacéutica: solución nasal.

Posología: aplicar una pulverización en cada fosa nasal cada 12 horas.

Indicación: trastorno del sueño.

Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.

Envase y almacenamiento: frasco spray nasal, a temperatura ambiente inferior a 25°C.

TERAPIA HORMONAL

Principio activo	Concentración
Testosterona	0,3 mg/mL a 3 mg/mL
PentraVan	c.s.p. 50 mL

Forma farmacéutica: crema vaginal.

Posología: aplicar 1 mL/día vía vaginal primeros 3 meses, luego reducir la aplicación a 2 veces/semana.^{6,7}

Indicación: deficiencia androgénica (fatiga, falta de libido, depresión y niveles plasmáticos de testosterona disminuidos). Trastorno del deseo sexual hipoactivo (DDSH).

Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.

Envase y almacenamiento: frasco unicontrol, a temperatura ambiente inferior a 25°C.



Principio activo	Concentración
Testosterona	0,3 mg/mL a 3 mg/mL
Pentravan	c.s.p. 50 mL

Forma farmacéutica: crema de uso externo.

Posología: aplicar 1 mL/ día en lugares sin vellos y con poco tejido adiposo como pulsos y antebrazos. Rotar el sitio de aplicación.⁸

Indicación: deficiencia androgénica (fatiga, falta de libido, depresión y niveles plasmáticos de testosterona disminuidos). Disturbio del deseo sexual hipoactivo (DDSH).

Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.

Envase y almacenamiento: frasco unicontrol, a temperatura ambiente inferior a 25°C.

Principio activo	Concentración
Testosterona	3 mg/mL
Vitamina D3	5000 UI/mL
Resveratrol	100 mg/mL
Pentravan	c.s.p. 30 mL

Forma farmacéutica: crema de uso intravaginal

Posología: aplicar 1 mL / día vía intravaginal con ayuda de la cánula, los primeros 3 meses, luego reducir la aplicación a 2 veces / semana.^{6,7}

Indicación: insuficiencia androgenética femenina: Tratamiento del disturbo del deseo sexual hipoactivo (DDSH). Estimulante de la función sexual y libidofemenina. Estimulante de la memoria y la cognición. Aumento de la fuerza y la masa muscular. Anti inflamatorio. Aumento de energía y resistencia física. Reducción del síndrome metabólico y riesgo de diabetes tipo II.

Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.

Envase y almacenamiento: frasco trilaminado con 5 cánulas, a temperatura ambiente inferior a 25°C.

ATU
ME
Di
DA



Principio activo	Concentración
17 β Estradiol	1 mg/mL
Estriol	4 mg/mL
Pentruvan	c.s.p. 50 mL

Forma farmacéutica: crema para uso externo.

Posología: aplicar 1 mL cada 24 horas, en muñecas, antebrazos u hombros.^{27, 28}

Indicación: tratamiento síntomas del climaterio - reposición de estrógenos: alivio de los síntomas vasomotores. Alivio de síntomas urogenitales. Combate flacidez y formación de arrugas en la piel. Estimulante del folículo piloso y crecimiento capilar.

Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.

Envase y almacenamiento: frasco unicontrol, a temperatura ambiente inferior a 25°C.

Principio activo	Concentración
Estriol	2 mg/mL
Pentruvan	c.s.p. 30 mL

Forma farmacéutica: crema para uso intravaginal.

Posología: aplicar 1 mL cada 24 horas (en la noche) por vía intravaginal con ayuda de la cánula. Tratamiento por 2 meses.

Indicación: tratamiento local de los síntomas de la atrofia vaginal producida por la deficiencia de estrógenos en mujeres postmenopáusicas. Tratamiento local de la sequedad vaginal en mujeres postmenopáusicas con atrofia vaginal.

Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.

Envase y almacenamiento: frasco trilaminado con 5 cánulas, a temperatura ambiente inferior a 25°C.

Principio activo	Concentración
Progesterona	50 mg/mL
Pentruvan	c.s.p. 30 mL

Forma farmacéutica: crema para uso intravaginal.

Posología: aplicar 1 mL cada 24 horas (en la noche) por vía intravaginal con ayuda de la cánula. Tratamiento por 15 días, seguido de un periodo de descanso de 15 días.

Indicación: terapia de reposición de progesterona: contraposición del efecto proliferativo estrogénico en mamas y útero. Estimulante de la formación de masa ósea. Mantenimiento del perfil lipídico. Protección cardiovascular y neurológica. Estimulante de la formación de colágeno.

Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.

Envase y almacenamiento: frasco trilaminado con 5 cánulas, a temperatura ambiente inferior a 25°C.

Principio activo	Concentración
Progesterona	15 mg/mL
Pentruvan	c.s.p. 50 mL

Forma farmacéutica: crema para uso externo.

Posología: aplicar 2 mL cada 24 horas, en muñecas, antebrazos, hombros o parte interna de los codos. Tratamiento por 15 días, seguido de un periodo de descanso de 15 días.

Indicación: terapia de reposición de progesterona: contraposición del efecto proliferativo estrogénico en mamas y útero. Estimulante de la formación de masa ósea. Mantenimiento del perfil lipídico. Protección cardiovascular y neurológica. Estimulante de la formación de colágeno.

Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.

Envase y almacenamiento: frasco unicontrol, a temperatura ambiente inferior a 25°C.

Principio activo	Concentración	Forma farmacéutica:
Estradiol	0,5 mg/mL	crema para uso externo.
Estriol	2 mg/mL	
Testosterona	180 mcg/mL	
Pentruvan	c.s.p. 50 mL	

Posología: aplicar 1 mL cada 24 horas en la mañana, en muñecas, antebrazos u hombros por 25 días al mes.

Indicación: aumento de masa ósea. Terapia hormonal asociada a suplemento de calcio y silicio

Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.

Envase y almacenamiento: frasco unicontrol, a temperatura ambiente inferior a 25°C.



ENDOMETRIOSIS TERAPIA NO HORMONAL

Principio activo	Concentración
Danazol	100 mg/mL
PentraVan	c.s.p. 50 mL

Forma farmacéutica: Crema para uso intravaginal.

Posología: Aplicar 1 mL cada 24 horas en las noches por 6 meses. Evitar la aplicación antes de tener relaciones sexuales.^{14, 15, 16}

Indicación: Tratamiento del dolor pélvico y dismenorrea asociado a Pinus pinaster 100 mg/día.

Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: Solicita ficha técnica.

Envase y almacenamiento: Frasco unicontrol, a temperatura ambiente inferior a 25°C

Principio activo	Concentración
Pinus Pinaster	100 mg
Resveratrol	30 mg

Forma farmacéutica: cápsulas.

Posología: tomar 1 cápsula cada 24 horas.

Indicación: tratamiento del dolor pélvico y dismenorrea asociado a Danazol 100 mg/mL. Inhibidor Natural de NF-KappaB.¹⁷

Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.

Envase y almacenamiento: frasco pastillero, a temperatura ambiente inferior a 25°C.

Principio activo	Concentración
Nimesulide	30 -50 mg/mL
PentraVan	c.s.p. 30 mL

Forma farmacéutica: crema para uso intravaginal.

Posología: aplicar 1 mL cada 12 horas con ayuda de la cánula, iniciando 4 días antes de la fecha estimada de la menstruación.

Indicación: tratamiento del dolor pélvico y dismenorrea asociado a Danazol 100 mg/mL (GIN-13).³⁰

Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.

Envase y almacenamiento: frasco trilaminado con 5 cánulas, a temperatura ambiente inferior a 25°C.

DISMINORREA TERAPIA NO HORMONAL

Principio activo	Concentración
Nimesulide	30 -50 mg/mL
Pentruvan	c.s.p. 30 mL

Forma farmacéutica: crema para uso intravaginal.

Posología: aplicar 1 mL cada 12 horas con ayuda de la cánula, iniciando 4 días antes de la fecha estimada de la menstruación.

Indicación: tratamiento del dolor pélvico y dismenorrea.³⁰

Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.

Envase y almacenamiento: frasco trilaminado con 5 cánulas, a temperatura ambiente inferior a 25°C.

MIOMATOSIS UTERINA, ENDOMETRIOSIS Y ADENOMIOSIS TERAPIA NO HORMONAL

Principio activo	Concentración
Miodesin	170 mg/mL
Pentruvan	c.s.p. 30 mL

Forma farmacéutica: crema para uso intravaginal.

Posología: aplicar 1 mL cada 24 horas en las noches con ayuda de la cánula, hasta por 2 meses.

Indicación: tratamiento del dolor pélvico provocado por miomatosis uterina, endometriosis y adenomiosis. Inhibidor de NF-KB y CoX-3.¹⁹

Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.

Envase y almacenamiento: frasco trilaminado con 5 cánulas, a temperatura ambiente inferior a 25°C.

Principio activo	Concentración
Miodesin	250 mg

Forma farmacéutica: cápsulas.

Posología: tomar 1 cápsula cada 24 horas, durante el tiempo estimados por el médico (mantenimiento), después de los dos meses intrauterinos iniciales con formula GIN-15.¹⁸

Indicación: tratamiento del dolor pélvico provocado por miomatosis uterina, endometriosis y adenomiosis. Inhibidor de NF-KB y CoX-3

Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.

Envase y almacenamiento: frasco pastillero, a temperatura ambiente inferior a 25°C.



FERTILIDAD TERAPIA HORMONAL

Principio activo	Concentración
Estradiol	3 mg/mL
Pentrvan	c.s.p. 30 mL

Forma farmacéutica: crema para uso intravaginal.

Posología: aplicar 1 mL cada 24 horas, por vía intravaginal con ayuda de la cánula.²⁷

Indicación: preparación Endometrial.

Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.

Envase y almacenamiento: frasco trilaminado con 5 cánulas, a temperatura ambiente inferior a 25°C.

Principio activo	Concentración
Estradiol	3 mg/mL
Progesterona	300mg/mL
Pentrvan	c.s.p. 30 mL

Forma farmacéutica: crema para uso intravaginal.

Posología: aplicar 1 mL cada 12 horas con ayuda de la cánula en días previos a la transferencia embrionaria y mantenimiento de 3 meses, en caso de gestación.²⁷

Indicación: pre-transferencia y mantenimiento

Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.

Envase y almacenamiento: frasco trilaminado con 5 cánulas, a temperatura ambiente inferior a 25°C.

VULVODINIA TERAPIA NO HORMONAL

Principio activo	Concentración
Gabapentina	3%
PentraVan	c.s.p. 50 mL

Forma farmacéutica: crema para uso vulvar.

Posología: aplicar 1 mL cada 8 horas en vulva.²⁶

Indicación: vulvodinia localizada y generalizada.

Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.

Envase y almacenamiento: frasco unicontrol, a temperatura ambiente inferior a 25°C.

VERRUGAS Y PAPILOMAS GENITALES

Principio activo	Concentración
Imiquimod	3,75%
Oxido de zinc	20%
Fitalite	c.s.p. 20mL

Forma farmacéutica: crema para uso externo.

Posología: aplicar 1 vez al día por un tiempo máximo de 8 semanas.^{20, 21, 22}
Remover el medicamento con agua y jabón pasadas 6 horas.

Indicación: tratamiento de queratosis actínica. Tratamiento de carcinoma de células basales superficiales. Verrugas genitales de origen viral. Infección por HPV en pacientes HIV+.

Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.

Envase y almacenamiento: frasco trilaminado, a temperatura ambiente inferior a 25°C.

Principio activo	Concentración
5 Fluorouracilo	0,5% a 5%
Ácido salicílico	2% a 10%
Versatile	c.s.p. 30 g

Forma farmacéutica: crema para uso externo.

Posología: aplicar una capa gruesa 2 veces al día sobre la zona afectada, cubriendo el borde con vaselina. No emplear en embarazadas o lactantes.³¹

Indicación: tratamiento para verrugas anogenitales causadas por una infección de transmisión sexual.

Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.

Envase y almacenamiento: frasco trilaminado, a temperatura ambiente inferior a 25°C.

INFECCIÓN VULVAR POR VIRUS DE VPH

Principio activo	Concentración
Imiquimod	3,75%
Oxido de zinc	20%
Fitalite	c.s.p. 20 mL

Forma farmacéutica: crema para uso externo.

Posología: aplicar 1 vez al día por un tiempo máximo de 8 semanas.^{20, 21, 22} Remover el medicamento con agua y jabón pasadas 6 horas.

Indicación: tratamiento de queratosis actínica. Tratamiento de carcinoma de células basales superficiales. Verrugas genitales de origen viral. Infección por HPV en pacientes HIV+

Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.

Envase y almacenamiento: frasco trilaminado, a temperatura ambiente inferior a 25°C.

Principio activo	Concentración
Imuno TF	50 mg
Vitamina C	25 mg
Vitamina D3	4000 UI
Zinc	25 mg
Celulosa, dióxido de silicio	c.s.p.


Forma farmacéutica: cápsula.

Posología: para adultos mayores de 18 años: Tomar 1 cápsula cada 12 horas, ingiriendo así 50 mg o 100 mg de Imuno TF al día, llevar a cabo por 1 mes, posteriormente descansar por 15 días y luego volver a iniciar, máximo por 2 ciclos. Después iniciar con 1 sola cápsula diaria, por un periodo máximo de 2 años.

Indicación: inmunomodulador, potencia y mejora la respuesta del sistema inmunológico.

Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.

Envase y almacenamiento: frasco pastillero, a temperatura ambiente inferior a 25°C.



FISURAS ANALES

Principio activo	Concentración	Forma farmacéutica: crema para aplicación anal.
Diltiazem	2%	Posología: aplicar entre 1 y 2 veces al día. ²³ Indicación: relaja los vasos sanguíneos y el músculo. Antiinflamatorio, analgésico.
Nimesulida	3 % c.s.p.	Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.
Fitalite	T30 g	Envase y almacenamiento: frasco trilaminado, a temperatura ambiente inferior a 25°C.

Principio activo	Concentración	Forma farmacéutica: crema para aplicación anal.
Nifedipino	0,2%	Posología: aplicar entre 1 y 2 veces al día. ^{24, 25} Indicación: relaja los vasos sanguíneos. Anestésicos tópico de efecto rápido y duración intermedia.
Lidocaina	4 %	Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.
Benzocaina	5%	Envase y almacenamiento: frasco trilaminado, a temperatura ambiente inferior a 25°C.
Base gel acuoso	c.s.p. 30g	

HEMORROIDES TERAPIA CORTICOSTEROIDE

Principio activo	Concentración	Forma farmacéutica: crema para aplicación perianal. Uso externo.
Betametasona	0,05 %	Posología: aplicar entre 1 y 2 veces al día.
Lidocaina	10%	Indicación: alivio temporal del dolor localizado, promueve la cicatrización y alivia el ardor y la picazón.
Óxido de zinc	15%	Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.
Extracto de hammamelis	5%	Envase y almacenamiento: frasco trilaminado, a temperatura ambiente inferior a 25°C.
Extracto de castaño de indias	3%	
Ungüento cremoso	c.s.p. 30g	

Comodidad,
seguridad y
confianza

DOLOR POR EPISIOTOMIA

Principio activo	Concentración
Lidocaina	10%
Extracto de caléndula	1 %
Epifactor	3,3%
Nimesulida	3%
Fitalite	c.s.p. 30 g

Forma farmacéutica: crema para aplicación vaginal.

Posología: aplicar 2 veces al día en la lesión.

Indicación: anestésico tópico. Cicatrizante y desinflamatorio. Bioestimulación (activa fibroblastos), regeneración tisular y cicatrización.

Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.

Envase y almacenamiento: frasco trilaminado, almacenamiento refrigerado entre 2°C -8°C.

PEZONES AGRIETADOS

Principio activo	Concentración
Epifactor	3,3%
D-pantenol	3%
Ácido Hialurónico fraccionado (Hymagic 4D)	1,5%
Nourisil	c.s.p. 30 g

Forma farmacéutica: crema para uso externo.

Posología: aplicación diaria en áreas afectadas.

Indicación: regeneración de la areola, cicatrizante.

Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.

Envase y almacenamiento: frasco trilaminado, almacenamiento refrigerado entre 2°C - 8°C.

A TU ME DIDA



IMPORTANTE
RETIRAR
ANTES DE
AMAMANTAR



COMBINACIÓN DE COMPONENTES CON EFECTO MULTIMODAL, DERMOPROTECTOR Y REPARADOR EN AGRIETAMIENTO DE PEZONES.

Contiene:

Lavanda: antiinflamatorio, antipruriginoso.

Caléndula: cicatrizante, calmante.

Melaleuca: antiinflamatorio, antimicótico y antibacterial.

Sangre de dragón: repitelizante, cicatrizante.

Óxido de zinc y titanio: antipruriginoso, genera una barrera protectora.



HIDRATANTES VAGINALES Y VULVARES

TERAPIA HORMONAL

Principio activo	Concentración	Forma farmacéutica: crema para aplicación intravaginal.
Hialuronato sódico	0,01%	Posología: aplicar 1 mL cada 24 horas con ayuda de la cánula.
Estriol	2 mg/mL	Indicación: hidratante vaginal. Atrofia vaginal por deficiencia de estrógenos.
Pentrvan	c.s.p. 30 g	Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.
		Envase y almacenamiento: frasco trilaminado con 5 cánulas, a temperatura ambiente inferior a 25°C.

TERAPIA NO HORMONAL

Principio activo	Concentración	Forma farmacéutica: crema para aplicación vulvar.
Ácido Hialurónico fraccionado (Hymagic 4D)	3%	Posología: aplicar 1 vez cada 24 horas.
Fenilpropanol (y) o-Cymen-5-ol (y) Decylene Glycol (Symguard CD)	0,5%	Indicación: hidratación vulvar, y desodorante.
Zymomonas Ferment (Black BeeOme)	1%	Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.
Versatile	c.s.p. 30 g	Envase y almacenamiento: frasco trilaminado, a temperatura ambiente inferior a 25°C.



FOLICULITIS Y PSEUDOFOLICULITIS

TERAPIA CORTICOSTEROIDE

Principio activo	Concentración	Forma farmacéutica: crema para aplicación externa.
Clindamicina	1%	Posología: aplicar 1 o 2 veces al día en el área afectada por 7 días.
Physavie	1 %	Indicación: foliculitis púbica y axilar.
Desonida	0,05%	Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.
Nourisil	c.s.p. 30 g	Envase y almacenamiento: frasco trilaminado, a temperatura ambiente inferior a 25°C.

TERAPIA NO CORTICOSTEROIDE

Principio activo	Concentración	Forma farmacéutica: crema para aplicación externa.
Tea tree oil	0,5%	Posología: aplicar 1 o 2 veces al día en el área afectada por 7 días.
Physavie	1 %	Indicación: pseudofoliculitis y foliculitis púbica y axilar.
D-pantenol	3%	Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.
Nourisil	c.s.p. 30 tg	Envase y almacenamiento: frasco trilaminado, a temperatura ambiente inferior a 25°C.



OUTMELAN

LIGHTENING

Línea para corregir las imperfecciones melánicas aún durante el día, con efecto rápido y duradero. Interrumpiendo pigmentación en 5 niveles.

 **LIBRE**
Hidroquinona y parabenos



INTENSIVE / ROSTRO

Diseñado para tratar todo tipo de manchas definidas. Ideal para el rostro.



HAND & BODY

Empareja el tono de la piel de zonas extremadamente delicadas como el área del bikini, rodillas, codos y manos. Resistente al sudor.



DESPIGMENTACIÓN VULVAR Y DE AXILAS

Principio activo	Concentración	
Genowhite	2%	Forma farmacéutica: crema para uso externo. Posología: aplicar entre 1 y 2 veces al día. Indicación: despigmentación de zonas sensibles y delicadas. Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica. Envase y almacenamiento: frasco trilaminado, a temperatura ambiente inferior a 25°C.
Biolumita	1%	
Ácido tranexámico	3%	
X50 pure white	1%	
Gluconolactona	4%	
Niacinamida	5%	
Nourivan antiox	c.s.p. 30 g	



ESTRÍAS EN EL EMBARAZO

Principio activo	Concentración
Epifactor	3,3%
D-pantenol	3%
Ácido Hialurónico fraccionado (Hymagic 4D)	1,5%
Nourisil	c.s.p. 30 g

Forma farmacéutica: crema para uso externo.
Posología: aplicación diaria en áreas afectadas.
Indicación: atenuación de estrías.
Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.
Envase y almacenamiento: frasco trilaminado, almacenamiento refrigerado entre 2°C - 8°C.

Principio activo	Concentración
Ácido hialurónico fraccionado (Hymagic 4D)	3%
Siliciumax	5%
Lípidos de avena (Oat lipid)	5%
Algisium	3%
Omega plus	3%
Ext. centella asiática	3%
Ext. cola de caballo	3%
Versatile	c.s.p. 120 mL o 240 mL

Forma farmacéutica: crema para uso externo.
Posología: aplicación diaria en áreas afectadas.
Indicación: prevención de la aparición de estrías.
Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.
Envase y almacenamiento: frasco bala, a temperatura ambiente inferior a 25°C.

ANTIEDAD

Principio activo	Concentración	Forma farmacéutica: crema para uso externo.
Alistin	1,5%	Posología: aplicación diaria en pecho, cuello y rostro.
Algisium	4%	
Silanetriol (and) hydrolyzed collagen (MS HC)	1,5%	Indicación: atenuación de las líneas de expresión facial.
X50 Skin Antiaging	1%	
Estriol	0,2%	Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.
Versatile	c.s.p. 30 mL o 60 mL	
		Envase y almacenamiento: frasco trilaminado, a temperatura ambiente inferior a 25°C.

JUVYNIT®
ANTI-AGING

CellmaTchD®
TECHNOLOGY

MATCH CELULAR CON DRONES

Con células madres de MARRUBIO BLANCO que elimina y neutraliza las especies tóxicas



RENEW

Acción profunda
antioxidante en fibroblastos

PREVENTION

Acción externa
integral

PIERNAS CANSADAS

Principio activo	Concentración	Forma farmacéutica: crema para uso externo.
Ext. centella asiática	3%	Posología: aplicación diaria u ocasional en piernas.
Ext. castaño de indias	3%	
Ext. hamamelis	3%	Indicación: relajante para piernas cansadas, especialmente formulado para las etapas del embarazo.
Ext. árnica	3%	
Ext. Manzanilla	3%	Contraindicaciones, precauciones y mecanismo de acción: solicita ficha técnica.
Ext. cola de caballo	3%	
Aceite tomillo	0,3%	Envase y almacenamiento: frasco bala, a temperatura ambiente inferior a 25°C.
Mentol	1,5%	



A TU ME Di DA



BIBLIOGRAFÍA

1. Basson R - N Engl J Med April, 2006 - 354;14
2. International Journal of Pharmaceutical Compounding, 2001 - Vol. 5 no 5
3. Berman J R, - The Journal of Urology V170(6),2003- 2333-2338
4. Aktari et al.; DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, 2014, 22;40
5. Safarinejad MR et al, BJU Int. 2010 Sep;106(6):832-9.
6. Maia H; et al; Pulsatile administration of testosterone by the vaginal route using Pentravan®; Presented in COGI Lisboa, Nov, 2012
7. Hugo Maia Jr. Vaginal administration of testosterone in Pentravan® and its effect on inflammatory and metabolic parameters in menopausal women with sexual dysfunction. International Conference on Women's Health, Gynecology & Obstetrics. July 08-10, 2014. DoubleTree by Hilton Hotel Chicago-North Shore Conference Center, USA.
8. Davis S. Ngl j med 359;19 november, 2008
9. Polonini HC, Brandão MAF, Ferreira AO et al. Evaluation of Percutaneous Absorption Performance for Human Female Sexual Steroids into Pentravan Cream. IJPC 2014; 18(4):332-340.
10. Nathorst-Bjoo J ; Floter A- Maturitas - V53(1), 2006 -11-18
11. Bolout S; Braunstein G -International Journal of Impotence Research 2005 17, 399-408
12. J.R. Aguilera*, a, P. Garza Riosa y A. Sánchez Zepedab; Calcio y vitamina D en la paciente climatérica
13. Ferrero S, Gillott DJ, Venturini PL, Remorgida V. Use of aromatase inhibitors to treat endometriosis-related pain symptoms: a systematic review. Reprod Biol Endocrinol. 2011;9:89. Published 2011 Jun 21. doi:10.1186/1477-7827-9-89.
14. M Igarashi, M Iizuka, Y Abe, Y Ibuki, Novel vaginal danazol ring therapy for pelvic endometriosis, in particular deeply infiltrating endometriosis., Human Reproduction, Volume 13, Issue 7, Jul 1998, Pages 1952-1956, <https://doi.org/10.1093/humrep/13.7.1952>
15. Ferrero S, et al.; Int J Gynaecol Obstet. 2011 May;113(2):114-9.
16. Igarashi M., et al.; Human Reproduction vol.13 no.7 pp.1952-1956, 1998
17. Maia H et al.; Treatment of refractory endometriosis related pain with vaginal gestrinone in Pentravan®; Gynecol Obstr, 2014 4;9
18. Maia H. et al. Treatment of Endometriosis and Leiomyoma with the Association of Miodesin and Gestrinone in Pentravan™ Through the Vaginal Route. J Clin Rev Case Rep, 2018; 3(7).
19. . Maia H. et al. Effect of Vaginal Miodesin™ in Pentravan™ on the Response to Progestin Therapy in Patients with Deep Endometriosis and Adenomyosis. J Clin Rev Case Rep, 2019
20. Khattar, J. A., Musharrafieh, U. M., Tamim, H., & Hamadeh, G. N. (2007). Topical zinc oxide vs. salicylic acid, lactic acid combination in the treatment of warts. International Journal of Dermatology, 46(4), 427-430.
21. Lopez, J.M., Informe técnico- Imiquimod; 2014-11;
22. Prof. Dr. M. A. Allevato, Dra. L. Donatti Act Terap Dermatol 2005; 28: 302 - Programa de educación continua- Verrugas genitales.
23. M.I. Fernández García*, R. Albornoz López, I. Pérez Rodrigo y J. Abellón Ruiz, Efectividad y seguridad de diltiazem 2 % tópico en fi sura anal, Farm Hosp. 2009;33(2):80-8
24. Drs. Andres Marin G, Juan Vergara B, Leonardo Espindola S, Rev. Chilena de Cirugía. Vol 54 - No 5, Octubre 2002; págs. 503-507
25. E. Martinena Padial, J. Pozuelos Estrada, J. Fernández Díaz, L. Marín Lencero, Las fisuras anales
26. Lori A. Boardman, MD, ScM, Amy S. Cooper, CRNP, MSN, Leo R. Blais, RPh, and Christina A. Raker, ScD, Topical Gabapentin in the Treatment of Localized and Generalized Vulvodynia.
27. Macer ML, Taylor HS. Endometriosis and Infertility: A review of the pathogenesis and treatment of endometriosis-associated infertility. Obstetrics and gynecology clinics of North America. 2012;39(4):535-549
28. Moskowitz D. - A comprehensive review of the safety and efficacy of Bioidentical Hormone for the management of menopause and related health risks - Alternative Medicine Review; 2006- 11:3- (208-223).
29. Amaral F. et al. Pinetonina:avaiiação da secreção de melatonina e cortisol e avaiiação da actividade moduladora sobre padrão de ondas cerebrais do eletroencefalograma. Institutp de Osmologia e Óleos Essenciais, 2017.
30. Hudson P., Sharlene L., Michele C.A., Anderson O.F., Marcos F.B., Nadia R.B., Feasibility study evaluating pentravan for the intravaginal administration of active pharmaceutical ingredients to reduce pelvic pain related to endometriosis.
31. Prof. Dr. Miguel Angel J. Allevato, Dra. Lucila B. Donatti; Verrugas Genitales, Educación continua; Prof. Dr. M. A. Allevato, Dra. L. Donatti Act Terap Dermatol 2005; 28: 302

NUESTRAS BRANDS

Contamos con una extensa línea de materias primas farmacéuticas y vehículos patentados, con el respaldo de cientos de estudios de estabilidad y seguridad, con los que se pueden elaborar preparados magistrales.

También suministramos todos los equipos necesarios y adecuados a las necesidades particulares de las preparaciones magistrales.

CONCEPTOS INNOVADORES EN VEHÍCULOS, PARA LA ELABORACIÓN DE **PREPARADOS MAGISTRALES ESTABLES Y SEGUROS PARA EL PACIENTE**



VEHÍCULOS PARA PREPARACIONES TÓPICAS

Pentravan:

Base de penetración transdérmica.

Bases Derma:

Completa línea de bases para preparaciones tópicas magistrales, de acuerdo a las necesidades del paciente y/o estabilidad del activo.

Bases TrichoConcept:

Completa línea de bases para preparaciones para la alopecia.



VEHÍCULOS PARA PREPARACIONES ORALES

Syrspend:

Línea de bases para preparar suspensiones de acuerdo a las necesidades del paciente y/o estabilidad de los activos.

Dilucap:

Completa línea de bases para preparación de cápsulas de acuerdo a los requerimientos farmacotécnicos de los principios activos.

Unispend:

Vehículo anhidro para preparar suspensiones anhidras, fácil de usar, que puede ser usado cuando la estabilidad de los activos en medio acuoso no es conocida.



www.fagron.co



SEDE PRINCIPAL

Carrera 1a # 4-02 Parque Industrial K2,
Bodega 15, Chía, Cundinamarca - Colombia



PBX Bogotá y resto del país: 601 390 5665

PBX Medellín: 604 605 0985



pedidos@fagron.com.co



@fagroncolombia
@fagronmedicinapersonalizada
@sunglass_fagron



Fagron Colombia