

# Alopecia frontal fibrosante (AFF)



Nuevo tratamiento off label con **Naltrexona oral a bajas dosis (LDN)**

En LDN bloquea receptores  $\mu$ ( $\mu$ ), siendo un modulador glial genera un efecto antiinflamatorio, por medio de la retroalimentación positiva que impulsará la activación de la  $\beta$ -endorfina. Dr. Ian Zagon.





## Prostaquinona™ en TrichoOil™ tópico

- ✓ Fitocomplejo (Timoquinona), derivado de *Nigella sativa L.*
- ✓ Inhibe el factor de transcripción NF-kB proinflamatorio, expresión de la COX-2 y la síntesis de  $PGD_2$ .



\*Los gráficos representan la variación de densidad /  $cm^2$  de la fibra capilar en los pacientes tratados con *Nigella sativa L.* y placebo después de 3 meses de tratamiento.



\*Los gráficos representan la variación del grosor de los hilos en los pacientes tratados con *Nigella sativa L.* y placebo después de 3 meses de tratamiento.

### Fórmula oral orientativa AFF

L-Cistina	10 mg
Naltrexona <sup>1,2</sup>	3 mg
SiliciuMax®	150 mg



### Fórmula tópica orientativa AFF

Prostaquinona™	3%
TrichoOil™	c.s.p 100 mL

Aplicar 1 a 2 veces al día.

Administrar 1 cápsula / cada 24 horas.